

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DETECCION PRECOZ DE B. CINEREA EN RAMILLAS DE ARANDANOS

- ❑ La muestra se conforma de aproximadamente 10-12 ramillas con racimos florales, tomándolas al azar dentro de un cuartel homogéneo que se desee evaluar, o bien, de ramillas tratadas después de una aplicación de agroquímico, seleccionándolas de manera aleatoria y que provengan de las hileras interiores y no de hileras borde.
- ❑ La muestra se debe enviar lo antes posible al laboratorio, en bolsa de papel o dentro de algún recipiente limpio y evitar la deshidratación.



- ❑ La muestra debe ser identificada, indicando nombre del cuartel, especie, variedad, edad, fecha del muestreo. Además debe adjuntar los siguientes antecedentes:
 - Nombre del productor y del predio.
 - Ubicación del predio: Dirección, localidad, comuna, región.
 - Datos de facturación: Rut, razón social, dirección, comuna, giro, teléfono.
 - Análisis solicitado, teléfono, celular y/o mail para contacto.
- ❑ Es importante que para hacer el diagnóstico, las muestras lleguen al laboratorio en buen estado, ya que en las muestras secas o descompuestas no pueden ser analizadas.

Para cualquier consulta, no dude en llamarnos.